

Duplication 1864
COOPER MEDICAL
COLLEGE
San Francisco, Cal.
UEBER

FAUNGSNIEREN.

NAUGURAL - DISSERTATION

WELCHE

ERLAUBNISS DER MEDICINISCHEN FACULTÄT

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD

ZUR

LANGUNG DER DOCTORWÜRDE

IN DER

MEDICIN, CHIRURGIE UND GEBURTSHÜLFE

AM 10. AUGUST 1867

ÖFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

DER VERFASSER

HERMANN JONAS

AUS BERLIN

OPPONENTEN:

KREMnitz, DR. MED.

VÖLKER, DRD. MED.

SCHMOHL, STUD. MED.

GREIFSWALD 1867.

DRUCK VON FR. HACHE.

guthaben und Hochachtung

Seinem

hochverehrten Vormund und Schwager

Adalbert Delbrück

in

Dankbarkeit und Hochachtung

gewidmet

vom

Verfasser.

Den Aerzten des Alterthums waren von den Erkrankungen der Nieren nur diejenigen Formen bekannt, die mit mikroskopisch nachweisbaren Veränderungen verbunden sind. Zwar wussten sie, dass häufig die Wassersucht mit Nierenleiden verbunden ist, auch vermutheten sie wohl die Abhängigkeit der ersteren von letzterer; in welcher Weise aber die Niere pathologisch-anatomisch und funktionell verändert sei, davon hatten sie wegen der mangelnden Hilfsmittel für die Untersuchung in den meisten Fällen keine Kenntniss.

Den ersten wichtigen Schritt auf diesem Gebiete that Asclepiades von Pergamon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts; er machte die Entdeckung, dass mit einigen Formen der Wassersucht Hämaturie verbunden sei, während dieselbe bei anderen fehle; er glaubte die Fälle von Nephritis mit Albuminurie auf Krankheiten der Niere, die Fälle ohne Albuminurie auf Leberleiden zurückführen zu können.

Einen grossen Fortschritt in der Erkenntniss der Nierenerkrankungen verdankt die Wissenschaft Richard Bright; er wies zuerst darauf hin, dass Wassersucht und Albumi-

nurie von bestimmt nachweisbaren pathologisch-anatomischen Veränderungen des Nierenparenchyms abhängig seien. Nach seinem Namen wurde, wie bekannt, jene grosse Gruppe von Krankheiten, in welchen Hydrops und Albuminurie in Folge von Nierenleiden auftreten unter der gemeinsamen Bezeichnung des Morbus Brightii zusammengefasst.

Erst Forschern unserer Tage, Reinhard, Traube und besonders Frerichs, war es vorbehalten, die sogenannte Bright'sche Krankheit in einzelne unter einander sehr verschiedene Krankheitsformen zu trennen; dieselbe zerfällt nach ihnen in folgende vier pathologisch-anatomisch sowie klinisch sehr differirende Formen:

1. Stauungshyperaemie der Niere.
2. Katarrhalische Nephritis.
3. Diffuse Nephritis.
4. Amyloïde Degeneration der Niere.

Ueber die erste dieser vier Formen, die Stauungshyperaemie der Niere, beabsichtige ich, im Folgenden zu handeln.

Als Stauungsniere bezeichnet man eine Niere, in welcher, gleichgiltig durch welche Ursachen, die normale Circulation eine Störung erlitten hat, in welcher das Blut sich staut. Der Name ergibt bereits, dass die Stauungsniere keine primäre, idiopathische Krankheit sein kann; wie sollte auch bei normalem anatomischem Bau der Niere ohne sonstige störende Einflüsse das Blut in derselben plötzlich einmal nicht mehr normal circuliren? Es gehört vielmehr zur Entstehung einer Stauungsniere eine Störung des Kreislaufes durch irgend welches mechanische Impediment. Derartige Circulationsanomalien kommen aber

die Erfahrung lehrt, sehr häufig, und durch die einfachsten Ursachen zu Stande; man kann sie in Localen und Ganzen eintheilen in solche, welche von dem arteriellen, und solche, welche von dem venösen Theile des Kreislaufs ausgehen. Die erstere Art des behinderten Kreislaufes, die arterielle, entsteht ausschließlich durch Störungen der Herzaktion, wie sie durch nicht compensirte Minderungen, durch Texturerkrankungen, fettige Degeneration des Herzmuskels, durch Aortenaneurysma, kurz durch verschiedene Herzkrankheiten, die mit Verminderung der Energie der Herzthätigkeit einhergehen, herbeigeführt wird. Unendlich zahlreicher sind die Ursachen, welche eine venöse Stauung herbeiführen können; es kann die ganze Circulation in den Lungen erschwert sein, in welchen die Circulation der Lungen erschwert ist, es können ferner mechanische Hindernisse, Tumoren des Abdomen, des Uterus gravidus, oder jeder denkbare Umstand, welcher im Stande ist, den Abfluss des venösen Blutes aus der Niere zu behindern, die Ursache für die Entstehung einer Stauungsniere werden.

Bevor wir jedoch an die Betrachtung unseres Thema's herantreten, sei es mir, im Interesse derselben, gestattet, kurz des normalen physiologischen Processes in den Nieren zu gedenken.

Die Funktion der Niere besteht bekanntlich darin, das überschüssige Wasser, sowie die Endprodukte der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel, welche keiner weiteren Oxydation im Körper, mithin nicht mehr fähig sind, durch Ausscheidung im weitesten Sinne des Wortes dem Organismus zu dienen, hauptsächlich also den Harnstoff, aus

demselben auszuschcheiden. Es geschieht diese Ausscheidung zuvörderst durch einen Filtrationsprocess in der Weise, dass durch den starken intraarteriellen Druck aus dem Glomerulis Wasser mit den Blutsalzen und jenen Endprodukten der Albuminreiche (Harnstoff etc.) in die Malpighischen Kapseln hineintritt, aus welchen es durch die Harnkanälchen abgeführt wird. Diese gehen nun mit den Vas efferentibus, von denen sie umspült werden, und welche das soeben durch den Wasserverlust eingedickte Blut führen, einen diosmotischen Process ein; der an gelösten Bestandtheilen sehr viel ärmere Inhalt der Harnkanälchen giebt an das Blut von seinem Wasser wieder ab, er wird also an sich schon concentrirter, während ausserdem noch durch denselben Process aus den Gefässen Salze, Harnstoff etc. in ihn hineintreten.

Diese rein physikalische Erklärung der Harnbereitung reicht jedoch nicht aus; es ist nämlich aus verschiedenen Versuchen als bewiesen anzusehen, dass der Harnstoff, wenn nicht gänzlich, so doch mindestens zum grossen Theil in der Niere erst gebildet wird; es ist hier nicht meine Aufgabe, weitläufig auf diese Frage einzugehen; ich erinnere deshalb nur an die schlagenden Experimente von Ludwig und von Oppler, bei denen nach Unterbindung der Urethra eine bedeutende Vermehrung des Harnstoffs im Blut eintrat, während diese Erscheinung nach Exstirpation der Nieren fehlte, von welchen Forschern weiterhin das Vorkommen von niedrigeren Oxydationsprodukten der Eiweisskörper vorzüglich des Taurin und Cystin in der Nierensubstanz nachgewiesen wurde, während dieselben sich bekanntlich nur in extrem seltenen Fällen im Harne vorfinden. Endlich sprich

die specifisch hohe Temperatur der Nieren (resp. des Venenblutes) dafür, dass in ihr ein lebhafter Oxydationsprocess statthabe.

Eine sehr wichtige Frage, die, wie wir weiter sehen werden, grade für die Erkenntniss des Wesens der Stauungsniere von der grössten Bedeutung ist, ist die: Wie kommt es, dass im normalen Harn, wie er von gesunden Nieren abgesondert wird, sich kein Eiweiss findet, da man doch von vorn herein vermuthen sollte, dass alle löslichen Bestandtheile des Blutes in gleicher Weise durch den Filtrationsprozess in den Malpighi'schen Bläschen abgeschieden würden? — die Antwort hierauf, (die plausibelste wünschenswerth, denn abgeschlossen sind die Untersuchungen darüber noch keineswegs) lautet, dass die Verbindung des Eiweisses mit dem Wasser des Blutes als keine ächte Lösung, sondern mehr nur als eine Quellung zu betrachten ist; es wird daher unter den gewöhnlichen Druckverhältnissen nicht die ächt gelösten Bestandtheile des Blutes, besonders die Salze durchfiltrirt werden können. Ferner wird angegeben, dass unter normalen Verhältnissen der Blutstrom durch den Glomerulis ein so rascher sei, dass das, wenn überfüllt, so doch nur sehr schwer filtrirende Eiweiss gewiss lassen gar nicht Zeit (?) habe, durch die Gefässwandung hindurch zu treten.

Nach diesen Betrachtungen ist es nicht schwer, den pathologischen Process der Nierenfunction bei Stauungen derselben zu verstehen.

Nehmen wir einmal an, die Niere sei leer, d. h. sie enthalte weder Blut noch Harn; es sei aber der Abfluss des Venenblutes durch irgend ein Impediment venöser Seits,

oder durch mangelhaften Druck arteriellerseits, was Beide im mechanischen Effect genau auf dasselbe hinausläuft, erschwert; jetzt trete durch die Arterien Blut in die Glomeruli durch den (auch bei Klappenfehlern wenn auch geschwächt, so doch immer vorhanden) arteriellen Druck desselben transsudirt Wasser mit den gewöhnlichen Harnsalzen in die Malpighi'schen Kapseln; wäre durch den vorhandenen gedachten venösen Druck, unter dem das ganze Organ steht, der Abfluss des Harnes, sowie die Weiterbeförderung des Blutes nicht erschwert, so wäre der normale Zustand vorhanden. Nun stagnirt aber der Harn in den Glomeruli, das Blut in den Gefässen; sei es nun, dass durch die Störungen, welche der Blutstrom erfährt, die Ernährung des Nierenparenchyms, besonders der Epithelien in der Weise leidet, dass letztere den normaler Weise nicht stattfindenden Austritt von Eiweiss aus dem Blute nicht mehr inhibiren können, sei es dass durch Diösmose in den Glomerulis, begünstigt durch die längere Berührung beider Flüssigkeiten Harn und Blut, die Ausscheidung desselben erfolgt, sei endlich, dass beide Momente zusammenwirken; genug, es gelangt Eiweiss aus dem Blute in den Harn.

Es giebt jedoch auch Fälle von Nierenstauungen, welche mit gar keiner oder wenigstens mit nicht constanten Albuminurie verbunden sind: man muss annehmen, dass in diesen Fällen die Intensität des Stauungsdruckes, für welche

*) Eine Stauungsniere lässt sich nach dem oben Gesagten auch ohne jedes Symptom, welches für eine solche spräche, mit mathematischer Gewissheit aus den veranlassenden Ursachen diagnosticiren.

a ein Maas nicht besitzen, wohl gross genug ist, um ops hervorzurufen, während die Druckhöhe, welche das is für seinen Durchtritt erfordert, nicht vorhanden ist. oft sehr beträchtlichen Schwankungen des Albumin- tes im Harn rühren von bis jetzt unbekannten, mög- rweise nervösen (vasomotorischen) Einflüssen her.

Die Urinmenge ist bei Stauungsnieren in der Regel htlich geringer, als in der Norm; auch diese Erschei- ist physikalisch leicht zu deuten; wir erkannten als rsache der Nierenstauung entweder Verminderung der aktion, oder Vermehrung des Widerstandes von venöser ; Beide werden in gleicher Weise bewirken, dass we- Blut als normal die Nieren passirt, dass mithin den- n, die an sich ganz gesund sein können, einfach ihr asmaterial geschmälert wird.

Wir theilten oben die Circulationsanomalien, welche Stauungsniere bedingen, ein in solche, welche vom um der Blutbahn, und solche, die von der Peripherie lben her einwirken. Als Prototyp für die erste Art en wir diejenigen Erkrankungen des Herzens hinstellen, welche der normale Druck des arteriellen Gefässsy- eine Schwächung erfährt. Es gehören hierher die enfehler der Mitralis, seien dieselben congenital oder sit in Folge einer Endocarditis; ferner die Erkrankun- des Herzmuskels; es können Ernährungsstörungen des- n die Herzaktion herabsetzen (fettige Degeneration); önnen Neubildungen in demselben ein mechanisches rmiss für die Entleernug des Ventrikels abgeben; ein ardiales Exsudat kann durch Druck auf das Herz die ebigkeit seiner Contraktionen, und damit seine Lei-

stungsfähigkeit herabsetzen. Eine Stenose der Aorta w selbst bei gesunden Herzen der aus demselben austretende Blutwelle ein Hinderniss in den Weg legen; nach dem setze, dass die Stromgeschwindigkeit einer Flüssigkeit, od was damit gleichbedeutend ist, der Druck, den dieselbe ausübt, verringert wird, wenn dieselbe aus einer engeren Röhre durch eine weitere wieder in eine engere strömt, wird eine Aortenaneurysma den Druck der Blutwelle vermindern, mithin die Ursache einer Stauung abgeben können.

Die Anzahl der Krankheiten, welche einen unvollständigen venösen Abfluss aus der Niere im Gefolge haben, noch viel grösser. Ich möchte sie der leichteren Uebersicht halber eintheilen in solche, welche direkt, und solche welche indirekt die Abfuhr des venösen Blutes verhindern oder erschweren. Unter directen Ursachen der Circulationsstörung in den Nierenvenen würde ich alle diejenigen zusammenfassen, welche durch einen mittelbar oder unmittelbar auf dieselben ausgeübten Druck ihr Lumen verkleinern. Hierher gehören Tumoren des Unterleibes, sei es, dass sie von den knöchernen Gebilden desselben ausgehen, wie Exostosen der Wirbelkörper, sei es, dass sie den Weichtheilen angehören. Jede Form der Neubildung im Abdomen kann, sofern sie die entsprechende Grösse erreicht, die Ursache einer venösen Stauung in der Niere werden. Es versteht sich von selbst, dass der Druck derselben weder die Niere selbst, noch die Vena cava oder vena renalis direct treffen braucht; denn wenn in einem abgeschlossenen von Flüssigkeit gefüllten Raume eine Stelle comprimirt wird, so pflanzt sich der Druck gleichmässig auf den ganzen Inhalt fort. Es kann aber das Cavum abdominis als ein m

igkeit gefüllter abgeschlossener Raum im physikalischen Sinne aufgefasst werden; denn wenn auch der Inhalt desselben kein flüssiger ist, so nimmt doch der halbflüssigen Massen und Luft angefüllte tractus intestinalis einen so überwiegend grossen Theil desselben ein, durch seine Vermittelung alle mit ihm in Berührung stehenden Organe wie durch eine Flüssigkeit mit einander verbunden sind; und wenn auch die Bauchhöhle nicht von den Wänden eingeschlossen ist, so helfen auf der andern Seite die über ihr natürliches Maass gezerzten Bauchmuskeln den gegebenen Druck noch verstärken. Wir rechnen daher hierher nicht nur die direkt die Nieren, resp. deren um comprimirenden Tumoren, wie Aneurysma der Aorta, vergrösserte Milz oder Leber, Echinococcen in derselben, u. s. w., sondern es gehören mit demselben Rechte hierher auch Geschwülste der Ovarien, des Uterus, besonders der Uterus gravidus, ferner Exostosen und Enchondrome der inneren Bauchwandungen, hydropische und entzündliche Ergüsse in die Peritonealhöhle, u, s. w.

Es bleibt noch übrig, denjenigen Veränderungen passiver Art, welche indirekt den venösen Abfluss aus den Nieren erschweren, mit wenigen Worten Rechnung zu tragen; es sind dies ausschliesslich Erkrankungen der Lungen. Wir wissen, dass unter normalen Verhältnissen die Lungen in zweifacher Weise einen wichtigen Einfluss auf die Blutbewegung ausüben. Erstlich wird durch die Aspiration des Thorax, d. h. durch die inspiratorische Ausdehnung der Lungen ein negativer Druck auf die grossen Venenstämme, welche in die rechte Vorkammer einmünden, ausgeübt, und dadurch ein wesentliches Moment für die venöse Circulation

gegeben. Begreiflicherweise kann dieses nur durch Erkrankung des Thorax oder der ihn beherrschenden Muskeln terirt werden. Ein zweiter und wichtigerer Umstand aber folgender: Wir wissen, dass eine ganze Reihe von Lungenkrankheiten, ja wir können sagen, mit wenigen Ausnahmen alle, sofern sie mit erheblicher Intensität auftreten den Endeffekt haben, dass eine mehr oder weniger ausgedehnte Partie des Lungenparenchyms verödet, sei es, dass ganze Theile des Organs degeneriren, wie bei der Tuberculose, der käsigen Pneumonie u. s. w., sei es, dass die Zerstörung sich auf Schwund der Alveolenwände beschränkt wie beim Emphysem; immer können die Lungen bei einiger Intensität der Krankheit nicht so viel Blut, wie ihnen vom rechten Ventrikel her zugeschickt wird, in sich beherbergen. Durch die übergrossen Anstrengungen, die das mit der Zeit hypertrophirte rechte Herz macht, um sein Blut trotz der Verkleinerung des Strombettes desselben, vollständig auszuschieben, tritt dann ganz gewöhnlich noch collaterales Oedem in den gesunden Partien der Lungen hinzu, welches seinerseits wieder die Schwierigkeiten der Circulation nur noch vermehrt. Schliesslich kommt es denn dazu, dass der rechte Ventrikel alles Blut, welches ihm von den beiden Hohlvenen zur Weiterbeförderung übergeben ist, nicht mehr spediren kann; von demselben Augenblick an ist aber dann auch die Stauung im Körper gegeben.

Das anatomische Bild einer Stauungsniere kann ein sehr verschiedenes sein. Es giebt ganz ausgesprochene Stauungsnieren mit allen ihr zugehörenden Attributen, ohne dass sich in ihnen, ausser der durch die Stauung bedingten venösen Hyperämie, pathologisch-anatomische Veränderungen

weisen liessen. Dies führt uns zu dem einfachen, aber
ss richtigen Schluss, dass eine Stauungsniere als solche
e morphologischen Veränderungen involvirt, dass die
ungsniere also keine specifische Erkrankung der Niere
st ist, sondern vielmehr nur den Schein einer solchen
rch simulirt, dass ihre normalen Functionen gestört
aber, wie wir gezeigt haben, durch ausser ihrem Be-
liegende Schädlichkeiten.

Oft ist jedoch der anatomische Befund bei Stauungs-
n auch ein pathologisch veränderter, und zwar wohl in
meisten chronisch verlaufenden Fällen. Es zeigt sich
lich, dass durch dieselben Circulationsstörungen, welche
specifischen Stauungserscheinungen hervorrufen, auf die
er auch die Nutrition des Organs selbst wesentlich lei-
die Veränderungen, welche dasselbe erfährt, werden
alb wesentlich degenerativer Art sein. Man findet nach
enstein, dessen vortreffliches Werk über Nierenkrank-
en ich der nachfolgenden Beschreibung hauptsächlich zu
de gelegt habe, die Niere meist grösser als normal,
n nur verkleinert; das Parenchym von verschiedener,
härterer, bald weicherer, Consistenz, die Oberfläche
mit narbig eingezogenen Partieen versehen. Auf dem
hschnitt erscheint die Corticalsubstanz verdickt, nur
en atrophisch, die Marksubstanz in ihren basilaren Theilen
kelroth, nahe den Papillen blass.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte die Glome-
meistentheils von normaler Grösse und intakt; manchmal
et man die Malpighi'schen Kapseln leicht verdickt und
s verkleinert, atrophisch. Das Zwischenbindegewebe
Marksubstanz wird bei langer Dauer des Leidens ver-

mehrt, und erscheint reich an Kernen. Die Epithelien der gewundenen Kanäle sind von unregelmässiger Gestalt und mit granulöser Masse, bisweilen auch mit Fetttröpfchen gefüllt. Die graden Kanälchen sind oft erweitert, varicös, ihr Epithel trübe, granulirt. Die Membrana propria der Harnkanälchen ist bedeutend verdickt, die venösen Gefässe stark erweitert.

Fassen wir die Resultate der pathologisch-anatomischen Untersuchung einer Stauungsniere mit dem in der Einleitung Gesagten zu einem Gesamtbilde zusammen, so ergiebt sich, dass der Organismus nicht im Stande sein kann, auf dem normalen Wege die Sekretionsstoffe der Nieren zu eliminiren. Producirt werden diese Stoffe aber, zum grössten Theil wenigstens, weiter. Was kann die Folge davon sein? Offenbar nur zweierlei; entweder: der Organismus findet andere Wege, um die eigentlich den Nieren zukommende Funktion vicariirend ausführen zu lassen; oder: der Körper kann sich jener Stoffe nicht entledigen; sie verbleiben also in ihm. Dieses einfache Raisonnement ergiebt aber auch mit einem Schlage den ganzen Symptomencomplex, dessen man sich bei Stauungsniere zu gewärtigen hat. Die Erfahrung lehrt nämlich in vollständiger Uebereinstimmung mit dieser Schlussfolgerung, dass das mit Wasser und den Endprodukten der Albuminkörper überladene Blut, da es von den Nieren keine wesentliche Erleichterung erfährt, nach und nach sämmtliche übrigen Gewebe des Körpers, gleichsam Abhilfe suchend, überfüllt. Je nachdem die einzelnen Organe fähig sind, von dem aufgestauten Blute mehr oder weniger in sich aufzunehmen, finden wir dieselben in höherem oder geringerem Grade

damit beschäftigt, ausser ihrer specifischen Thätigkeit auch noch vicariirend die excretorischen Funktionen der Nieren mit zu versehen. So sehen wir vor allen anderen Organen den Verdauungskanal, und in ihm besonders den Magen, sich bestreben, das überschüssige Wasser aus dem Körper zu entfernen. Das Sekret der Magen- und Darmdrüsen ist sehr bedeutend über die Norm vermehrt, ein chronischer Katarrh hat sie befallen; da durch den hohen Druck im ganzen Venensystem auch dem Chylus, mit welchem das transsudirte Blutwasser unter normalen Verhältnissen wieder aufgenommen werden könnte, der Eintritt in die Chylusgefässe, resp. in die Venen erschwert wird, da in Folge dessen von Letzterem weiter unten im Darmkanal Nichts oder nur sehr wenig wieder resorbirt werden kann, so wird dasselbe mit den Fäcalstoffen entleert werden. Ein sehr gewöhnliches Symptom der Nierenstauung ist daher ein chronischer Magen- und Darmkatarrh, verbunden mit chronischen Diarrhoën. (Dass auch die Therapie dieses Abzugsmittel in ihren Heilbestrebungen zu benutzen sucht, soll weiter unten weitläufiger besprochen werden)

Aber wo bleibt der Harnstoff und die niedrigeren Oxydationsstufen der Eiweisskörper?

Dieser Frage gegenüber müssen wir nun freilich bekennen, dass der weiteren Forschung auf diesem Gebiete noch viel Spielraum bleibt; nur so viel weiss man, dass ein geringer Theil dieser Stoffe ebenfalls durch den Verdauungskanal ausgeschieden wird. Es haben nämlich die Versuche an Thieren, namentlich die ausgezeichneten Untersuchungen von Bernard und Barreswill gelehrt, dass nach Exstirpation der Nieren, oder nach Unterbindung der

Nierenvenen, die Sekrete des Verdauungskanales nicht nur an Masse zunehmen, sondern constant schon nach wenigen Stunden Ammoniaksalze enthalten; dieses Vorkommniss kann nur aus der Umsetzung des Harnstoffes in kohlensaures Ammonium erklärt werden.

Welche chemischen Ursachen diese Umsetzung des Harnstoffes im Blute bewirken, das ist uns allerdings bis jetzt ebensowenig bekannt, als wir uns die andere, ebenso wichtige Frage beantworten können, wie überhaupt die verhältnissmässig grosse Menge Harnstoff ins Blut hineinkommt, da wir doch wissen, dass normaler Weise derselbe seinem grösseren Theile nach zum mindesten, erst in den Nieren gebildet wird; wo ferner die niedrigeren Oxydationsstufen der Eiweisskörper, die doch notorisch im Körper gebildet werden, und welche unter normalen Verhältnissen das Material bilden, aus dem der Harnstoff in den Nieren entsteht, wo diese Körper (Kreatin, Kreatinin, Hypoxanthin, Xanthin u. s. w.) verbleiben, da man doch vom chemischen Standpunkte aus sich nicht erklären kann, dass auch diese Stoffe sich ohne Weiteres in Ammoniaksalze verwandeln, während sich physiologischer Seits nicht annehmen lässt, dass diese Körper, da ihnen ihre Verwandlung resp. Oxydation zu Harnstoff in den Nieren nicht mehr möglich ist, nun diese Umsetzung bereits in den Geweben oder im Blute erfahren.

Wir sahen oben, dass der Verdauungsapparat vicariirend die Funktion der Niere, wenigstens zum Theil übernimmt. Leider hat das aber bald seine Grenzen, und zwar zum grossen Schaden für die Patienten. Es lehrt nämlich die Erfahrung, dass die Albuminabkömmlinge des Blutes, hauptsächlich also der Harnstoff, zwar noch in kohlensaures

Ammonium umgesetzt werden, dass aber Magen und Darmkanal auf die Dauer nicht im Stande sind, dasselbe auch nur einigermaßen vollständig fortzuschaffen; und das hat seine gute Begründung in den anatomischen Verhältnissen dieser Theile, welchen nur soviel Blut zugeführt wird, als zur Ernährung derselben und zur Ausübung ihrer spezifischen Funktion erforderlich ist, welche sich aber keineswegs zu Excretionsorganen des Blutes qualificiren. Die Folge ist also, dass das kohlen saure Ammonium im Blute zurückbleiben muss; dieser Ausgang involvirt dann jenes befürchtete Endstadium aller Nierenkrankheiten, die mit totaler Funktionsunfähigkeit derselben verbunden sind, die hämische Intoxikation.

Es ist nun aber nicht allein der Verdauungskanal, der von dem mit Wasser und kohlen saurem Ammonium überladenen Blute attackirt wird; im Gegentheil werden alle übrigen Organe von demselben in gleicher Weise belästigt. Die Respirationsorgane, welche, wie wir oben sahen, oft der Sitz der Grundkrankheit sind, mithin an sich schon beträchtlich an ihrer Funktionsfähigkeit gelitten haben, werden jetzt noch von dem mit Wasser überladenen Blute bedrängt; da sie durch ihren anatomischen Bau ganz besonders zu Katarrhen prädisponirt sind, so werden letztere unter so günstigen Verhältnissen für sie sicher nicht ausbleiben; die hoch respirationsfähigen Parteen der Lungen werden daher in mehr der Sitz intensiver Katarrhe, welche die Respiration in so gewaltigen Grade stören können, dass von ihnen das Leben durch Suffocation direkt bedroht sein kann.

Eine höchst interessante Betrachtung knüpft sich an das eben Gesagte an, wie bei einem einigermaßen compli-

cirten Krankheitsprocess ein und dasselbe Organ von den allerverschiedensten Seiten her zu leiden haben kann.

Wir sahen, dass die Lungen oft durch irgend welche primäre Krankheit der Grund einer Stauung sein können; durch die Stauung in ihnen in Folge dieses Leidens entwickeln sich ein Hydrops ascites, welcher durch Druck auf die Lungen von unten her die Ausgiebigkeit ihrer Bewegungen, mithin ihre Funktion stört; derselben Ascites hilft durch Druck auf die Unterleibsorgane die allgemeine Stauung vermehren, welche durch Katarrhe, resp. durch collaterales Oedem der Lungen ihre Thätigkeit herabsetzt. Da durch die Stauung schliesslich auch mangelhafte Ernährung der Lungen eintritt, so sehen wir auch von dieser Seite her als vierte Schädlichkeit von demselben Grundleiden ausgehend allgemeine Atrophie der Lungen mit ihren Folgen eintreten. Dieselbe Betrachtung liesse sich ganz analog in Bezug auf das Herz durchführen.

Ob und in wie weit die parenchymatösen Organe des Unterleibs von dem pathologisch veränderten Blute in Bezug auf ihre specifischen Sekretionen alterirt werden, darüber ist mir Nichts bekannt. Es steht dagegen fest, dass sie sowohl, wie alle übrigen Gewebe, vor Allem das Bindege- webe durch Austritt von seröser Flüssigkeit aus dem überfüllten Gefässsystem oedematös infiltrirt werden. Wir sehen daher als constantesten Begleiter hochgradiger Stauungen den Hydrops in allen seinen Formen auftreten.

Ich will an dieser Stelle erwähnen, dass Traube die sogenannten urämischen Gehirnerscheinungen von Gehirn-oedem abgeleitet wissen will. Es ist gewiss sehr einleuchtend, dass in vielen Fällen diese Schädlichkeit zur

Vervollständigung des Bildes der urämischen Intoxication mitwirkt; dass diese Erklärung aber nicht die Frerichs'sche Theorie von der urämischen Intoxikation gänzlich zu stürzen vermag, dafür scheint mir der Umstand zu sprechen, dass nachweislich kohlen-saures Ammonium in den betreffenden Fällen im Blute enthalten ist, in Verbindung mit der physiologischen Erfahrung, dass Injectionen dieses Stoffes bei Thieren der urämischen Intoxikation schlagend ähnliche Anfälle hervorbringen, dass mithin wohl der Schluss erlaubt ist, dass unter gleichen Verhältnissen und bei gleichen Effekten in beiden Fällen wohl auch der gleiche Causalnexus vorhanden sein möge.

Was wir bis jetzt über die pathologisch-physiologischen Veränderungen, die das Gefolge der Stauungsniere ausmachen, gesagt haben, ist theoretisch zwar ganz richtig, und für die Fälle, wo durch irgend welche Ursache die Nierenfunktion vollständig aufgehoben ist, den Erfahrungen durchaus gemäss. Nur darf nicht vergessen werden, dass das Bild einer Stauungsniere klinisch dadurch bedeutend modificirt wird, dass dieselbe fast nie einer vollständigen Unthätigkeit der Niere gleichkommt. Es funktioniert die Niere meistens, und sie hätte wohl die Fähigkeit dazu, viel mehr zu arbeiten, wenn ihr nur mehr Material zugeführt würde; das Resultat kann deshalb nur wegen letztgenannten Umstandes kein genügendes sein; und zwar stehen, je grösser das Impediment der Circulation, die Stauungsursache, desto grösser auch die Stauung und die Folgen sind, Stauungsursache und Stauungssymptome in gradem proportionalen Verhältniss zu einander.

Zweitens erhält aber das klinische Bild einer Stauungs-

niere dadurch einen frappant anderen Ausdruck, wie das rein für absolute Funktionsunfähigkeit der Niere oben gezeichnete, dass in dem secernirten Harn selbst Veränderungen auftreten, welche für Diagnose, Prognose Symptomatologie und Therapie der Krankheit von dem allerwichtigsten Einfluss sind, so wichtig, dass sie eigentlich das klinische Bild der Stauungsniere erst recht charakterisiren; es sind diese Veränderungen das Vorkommen von:

1. Albumin,
2. Blutkörperchen,
3. Epithelialzellen

im Harn.

Der Albumingehalt des Urins kann nach dem in der Einleitung gesagten leicht physikalisch erklärt werden; wir sahen oben, dass das Eiweiss des Blutes im gesunden Organismus deshalb nicht in den Harn übergeht, weil es als unächte Lösung eines stärkeren Druckes bedarf, wie der normale Blutdruck in der Niere ist, dass dasselbe ferner bei gegebener Druckhöhe einer längeren Zeit bedarf, um die Gefässwandungen zu durchdringen, als die ächt gelösten Bestandtheile des Harnes. Beide Bedingungen sind aber in der Stauungsniere gegeben. Es ist nämlich, wie wir gezeigt haben, in allen Fällen von Nierenstauung der Druck auf die Venen, mithin weiter auch auf die Capillaren vermehrt, es bedarf daher auch eines stärkeren Druckes arteriellerseits, um das Blut durch die Capillargefässe hindurchzupressen; steigert sich doch der Druck in denselben in vielen Fällen so enorm, dass sie zerreißen, dass mithin Blut in die Harnkanälchen eintritt. Die zweite Bedingung für die Albuminurie, die längere Berührung des Blutes mit

der transsudirenden Gefässwand, ist aber schon mit dem Begriff der Stauung hinlänglich charakterisirt; wir erkennen ja als die Grundursache derselben in allen Fällen ein Circulationshinderniss im Gebiete der Venen, durch welches natürlich der Blutstrom abgeschwächt werden muss. Was das dritte Characteristicum des Sekretes der Stauungsniere, die Epithelialzellen, anbetrifft, so ist ihr Vorkommen wohl nur auf die vorgeschritteneren Fälle beschränkt, in welchen durch die Störung der Blutcirculation die Nutrition des Organs bereits beträchtlich gelitten hat. Findet erst einmal die Abstossung des Epithels statt, so wird dadurch dem Albumin der Durchtritt noch wieder wesentlich erleichtert.

Das klinische Bild einer Stauungsniere ist schwer zu zeichnen, da je nach der Verschiedenheit der dieselben complicirenden oder vielmehr veranlassenden Krankheiten, verschiedene Symptome in den Vordergrund treten müssen. War hochgradiges Emphysem das Circulations-Hinderniss, aus welchem die Stauung in der Niere resultirte, so ist begreiflicher Weise das Bild ein anderes, als wenn der schwangere Uterus, ein Klappenfehler u. s. w. dieselben hervorrief.

Trotzdem sei mir der Versuch gestattet, die auf Rechnung der Nierenstauung als solcher kommenden, und für sie speciell charakteristischen Symptome zu schildern.

Wir lernten oben als ein Hauptsymptom der Nierenstauung den Eiweissgehalt des Urins kennen. Dies bildet auch für die Betrachtung der klinischen Erscheinungen einen passenden Ausgangspunkt; das Albumin, welches durch den

Harn abgeht, ist für den Organismus verloren; ein Theil des für den an sich schon kranken Körper so nöthigen Ernährungsmaterials wird ihm auf diese Weise entzogen; die Folge davon kann nur eine Schwächung desselben sein; das Blut wird ärmer an Eiweiss, kann also auch nur weniger davon an die Gewebe des Körpers als Ernährungsmittel abliefern; es leidet folglich in erster Reihe die Nutrition aller Theile mehr oder weniger.

Wir zeigten ferner, dass die Grundkrankheit, welche die Nierenstauung hervorrief, meist mit Oedem verbunden ist; dieses wird durch die Armuth des Blutes an Eiweiss, durch die Hydraemie, den Gesetzen der Diosmose zufolge, noch beträchlich vermehrt. Wir finden die Kranken dem entsprechend gedunsen im Gesicht, die Augenlider geschwollen, oft in so hohem Grade, dass die Augen gänzlich von ihnen verschlossen werden, Oedeme im Unterhautbindegewebe des ganzen Körpers, vorzüglich der unteren Extremitäten, hydropische Ergüsse in die serösen Häute, besonders Hydrops ascites, welcher seinerseits wieder durch Druck auf die Vena renalis die Stauung in den Nieren vermehren hilft. Ganz ausgezeichnet charakteristisch ist die livide Färbung der Nasenspitze, der Wangen, der Ohren, der Fingernägel u. s. w. als Theilerscheinung der allgemeinen venösen Stase.

Der Druck, welchen der hydropische Erguss in die Bauchhöhle auf die Lungen ausübt, vergrössern die Athemnoth des Patienten, welche schon durch die aus der gleichen Ursache entstandenen heftigen Katarrhe einen intensiven Grad erreicht hatte. Die schwachen Kräfte des Patienten

werden von den Magen- und Darmkatarrhen auf das furchtbarste mitgenommen; anstatt dass Magen und Darm durch Zufuhr neuen Ernährungsmaterials gleichsam als letzter Bundesgenosse helfen sollte, hilft er vielmehr auf diese Weise an dem Verderben des Organismus die letzte Hand anlegen. Zu allen diesen traurigen Complicationen gesellt sich in den letzten Stadien der Krankheit noch die Erkrankung des Central-Nervensystems hinzu, welche dann den letzten, entscheidenden Schlag auf den zerrütteten Körper führt. Die Ueberladung des Blutes mit kohlensauren Ammonium, dem Umsatzprodukte des Harnstoffes, in Verbindung mit der Ueberhäufung desselben mit Kohlensäure, dem Resultat des Lungenödems, jedenfalls auch der Druck, den die Nervenmasse des Gehirns, durch Oedem und Ergüsse dasselbe, erleidet, führen dann endlich jene Erscheinungen herbei, welche den bevorstehenden Exitus letalis sicher prognosticiren: furibunde Delirien, mit Convulsionen, heftigem Erbrechen u. s. w. verbunden, welche allmählig dem comatösen, soporösen Stadium Platz machen, das dann früher oder später, jedenfalls aber und unwiderruflich, nur mit dem Tode des Individuums endet.

Was die Diagnose der Stauungsniere anlangt, so unterliegt dieselbe bei der soeben geschilderten Intensität der Symptome keiner Schwierigkeit. Wo eine Krankheit vorhanden ist, welche die Ursache einer Stauung in den Nieren (s. oben) abgeben kann, wo ferner der Harn spärlich und saturirt ist, und mehr oder weniger Eiweiss oder gar Blutkörperchen und Epithelialzellen enthält, wo die aus allen dem resultirenden oben geschilderten Folgezustände vorliegen, da ist die Diagnose einer Stauungsniere gesichert.

Die Prognose derselben ist im Wesentlichen der Prognose der Grundkrankheit gleich. Haben wir einen Patienten mit einer sehr vorgeschrittenen Lungentuberculose, die den grössten Theil des Organs bereits verödet hat, haben wir hochgradiges Emphysem mit grosser Dyspnoë, Herzfehler mit beträchtlicher Insufficienz u. s. w. vor uns, so wird auch die Prognose der aus diesen Schädlichkeiten hervorgegangenen Nierenstauung keine günstige sein. War dagegen die Stauung durch Druck des schwangeren Uterus auf die Nierenvenen, durch angehäuften Kothmassen, durch acute Lungenkrankheiten u. s. f. entstanden, so ist die Prognose für diese Fälle ebenso günstig, wie für jene ungünstig zu stellen. Denn da die Niere von ihrer normalen Funktionsunfähigkeit durch die Stauung, in der ersten Zeit wenigstens, Nichts einbüsst, so wird nach Entfernung des Circulationshindernisses jeder Grund für weitere Sekretionsanomalien der Niere fehlen.

Die Therapie ist bei Nierenstauungen der Hauptsache nach gegen die Grundkrankheit zu richten. Können wir dieser beikommen, so heben wir mit ihr die Stauung in der Niere. So sehen wir, wenn Nierenstauung als Folgeerscheinung der Gravidität auftritt, dieselbe meist gleich nach der Entbindung freiwillig verschwinden. Sind scybaloöse Massen in den dicken Gedärmen die Ursache der Stauung, so curiren wir dieselbe durch ein reichlich wirkendes Drasticum in Verbindung mit der Application von Klysmen mit einem Schlage. Treten bei Nierenstauung in Folge von Gravidität der Hydrops und die urämischen Erscheinungen in so heftigem Grade auf, dass aus ihnen für

Nutter und Kind Gefahr erwächst, so ist die Frühgeburt *) anzuleiten.

Trauriger ist es mit der Therapie bestellt, wo die indicatio causalis nicht zu erfüllen ist; wir sind in diesen Fällen, die leider die bei weitem häufigeren sind, rein auf die symptomatische Behandlungsweise angewiesen. Hier ist dann vor Allem die Ableitung auf den Darmkanal indicirt, um durch Verminderung der venösen Spannung den Abfluss des Nierenvenenblutes zu erleichtern.

Die Albuminurie erfordert eine kräftige, nahrhafte, leicht verdauliche Diät, um die verlorenen Stoffe nach Möglichkeit zu ersetzen. Gegen den Hydrops wird mit sehr gutem Erfolge die sogenannte trockene Diät in Anwendung gebracht; d. h. die Speisen werden möglichst arm an flüssigen Bestandtheilen gereicht; es muss jedoch daran erinnert werden, dass in denselben Gewürze, Salze u. s. w., die erfahrungsmässig den Durst anregen, vermieden werden müssen; eintretendes Durstgefühl wird durch auf die Zunge gelegte Eisstückchen beseitigt. Gegen das besonders lästige Oedem der unteren Extremitäten empfiehlt sich die Einwicklung derselben mit Binden, Gummistrümpfen u. s. w. Wird die Spannung der Haut in Folge des Hydrops zu gross, so verschaffen nach Traube oberflächliche Scarificationen wenigstens vorübergehende Erleichterung. Wo der Hydrops ascites durch seinen Umfang Gefahr droht, die

*) Die besagten Erscheinungen werden in ihrer lebensgefährlichen Höhe immer erst bei vorgerückter Gravidität eintreten, wo die künstliche Frühgeburt die Erhaltung des Kindes ausserhalb des Uterus wahrscheinlich macht.

Lungen zu sehr zu comprimiren, da erscheint selbst die Punktion der Bauchhöhle erlaubt, um wenigstens momentane Linderung zu schaffen. Nur sei man mit dieser Operation nicht zu freigiebig, sondern betrachte sie vielmehr, ähnlich wie den Aderlass in der Pneumonie, als ultimum refugium, da sehr wohl zu bedenken ist, dass in dem entleerten Erguss eine erhebliche Quantität Eiweiss enthalten ist, welche bald ebenso wie das Wasser auf Kosten des Organismus wieder ersetzt wird; diese Ueberlegung lässt die Stellung, welche die Punktion des Abdomen therapeutisch einnimmt, wohl nur als die eines Euthanasticum, eines Mittels, welches dem Patienten die letzten Stunden seines Lebens noch in Etwas erleichtern hilft, erkennen.

Gegen den zu Ende eintretenden Collapsus, den Vorboten des Todes, wenden wir Excitantia, wie Kampher, Moschus, Wein etc. an, nicht in der Hoffnung, irgend welche günstige Wendung der Krankheit zu erzielen, auch nicht um dem in Sopor liegenden Patienten in seinem eigenen Interesse sein nur noch eben vegetirendes Dasein für einige Stunden zu fristen, auch nicht der Angehörigen des Kranken wegen, denen im Grunde auch nicht damit gedient ist, den Todeskampf auf Tage ausgedehnt zu sehen; sondern weil es unsere Pflicht ist, in allen Fällen, auch in den hoffnungslosesten, das Leben eines Menschen zu erhalten, so lange es mit unsern menschlichen Mitteln erhalten werden kann.

Ich gehe jetzt über zu der Beschreibung der Fälle von Stauungsniere, die meinen obigen Betrachtungen zu Grunde gelegen haben.

Fall I.

Am 23. Mai 1867 wurde der Büdner Theodor Glaser, 43 Jahre alt, in die Klinik des Herrn Professor Mosler aufgenommen. Die Anamnese, welche im Ganzen nur auf ungenauen Angaben des Patienten basirte, ergab, dass derselbe in seinen Kinderjahren öfter einige Tage krank gelegen habe, nachdem er vorher einen Frost bekommen habe. Zwischen seinem 20. und 40. Jahre hat Patient $\frac{1}{4}$ Jahr lang an Intermittens quotidiana gelitten. Husten und Auswurf sind schon von Jugend auf bei ihm vorhanden gewesen. Wegen Brustschwäche wurde er nicht Soldat. Verschiedene Male hat Patient Pneumonien überstanden. Zwischen seinem 30. und 40. Jahre hat er 6 Wochen krank gelegen, nach den angegebenen Symptomen zu schliessen, an Typhus. Seit vier Wochen giebt er an, im Leibe geschwollen zu sein; eine Ursache weiss er hierfür nicht anzugeben.

Seine augenblicklichen Klagen sind Schlaflosigkeit, Luftmangel, Husten und Auswurf, und ein Gefühl von Völle im Epigastrium. Appetit und Stuhlgang sind normal. Beim Urinlassen hat Patient keine Beschwerden. Ikterus hat derselbe früher noch nie gehabt. Seine Eltern sind vor 3 Jahren, wie er angiebt, an einer Brustkrankheit gestorben. Von seinen 4 Kindern ist 1 gestorben; 3 sind gesund.

Der Status praesens ergab bei der Adspection eingedunkeltes Gesicht, bläuliche Lippen, mageren Körper, gelbweisse Hautfarbe, Brust, Ober- und Vorderarme, sowie Rücken, Hinterbacken und Oberschenkel mit Stecknadelknopf- bis kirschengrossen Petechien von blaurother Farbe wie übersät.

Die unteren Extremitäten sind oedematös geschwollen; eine Temperatursteigerung ist nicht vorhanden, der Puls klein. Der Thorax ist emphysematös gewölbt, der Halz kurz, die Muskulatur desselben hervorspringend, der Bauch durch Ascites aufgetrieben.

Die Untersuchung der Lunge ergab rechts hinten oben eine vollständige Dämpfung; zahlreiche feuchte mittel-grosse Rasselgeräusche sind daselbst wahrzunehmen; nach unten zu ist das Rasseln stärker, das Athmen scharf; ganz unten Rasselgeräusche vom kleinsten Kaliber.

Die linke Lunge ergibt im Ganzen ähnliche Symptome eines hochgradigen Katarrhes.

Der Anschlag des Herzens ist aussen nicht sichtbar; die Intercostalmuskeln werden bei der Inspiration eingezogen. Die Lebergrenze beginnt am oberen Rande der 5. Rippe; die Herzdämpfung am unteren Rande der 3. Rippe; dieselbe ist nach rechts mässig verbreitert. Ein Urtheil über die Herztöne lässt sich wegen der dieselben übertönenden Rasselgeräusche der Lungen nicht fällen.

Die Sputa sind zähe, rostfarben; der Urin ist sauer, concentrirt; sein spec. Gewicht 1013. Eiweiss nur in geringer Menge in demselben enthalten.

Verordnet wurde: 3mal täglich 5 gr. Chinin; Wein; täglich ein lauwarmes Bad.

29. 5. Aussehen des Patienten blass. Puls sehr klein, Extremitäten kühl; Oedem der unteren Extremitäten deutlicher ausgesprochen; starker Luftmangel. Die Haut ist sehr spröde und trocken, der Bauch aufgetrieben.

1. 6. Puls sehr klein, kaum noch fühlbar; das Aussehen livider, mehr ikterisch gefärbt. Blutig-eiterige Sputa

eten auf. Die Herztöne sind nicht hörbar. Ascites und Nasarka haben beträchtlich zugenommen. Der Urin sehr trübe, mit gelblichen Schaum; Eiweiss in demselben nicht nachzuweisen; dagegen ist die Reaktion auf Gallenfarbstoffe deutlich.

Die dyspnoëschen Erscheinungen, hervorgerufen durch Lungenemphysem und hochgradigen Ascites nahmen von Tag zu Tag zu, so dass ihnen der Patient am 6. Juni unter den Symptomen der Kohlensäureintoxikation erlag.

Die am folgendem Tage von Herrn Prof. Grobe vorgenommene Autopsie ergab folgenden höchst interessanten Befund:

Mässig genährter Körper; starkes Oedem der unteren Extremitäten und des Scrotums, schwächeres an den oberen. Mässiger Ascites. Muskeln am Rücken und Thorax ebenfalls oedematös. Auf dem Thorax, den Schenkeln und Vorderarmen zahlreiche blassrothe Ecchymosen; am Thorax links eine grössere, rechts am Bauche zwei erbsengrosse Ecchymosen. Die Nagelglieder livid blauroth, rechts stärker als links. Das Unterhautfettgewebe fast vollständig verschwunden.

Die Schädelkappe normal dick, dura mater ikterisch gefärbt, etwas verdickt, rechts mit den weichen Häuten etwas verwachsen. Im Sinus longitudinalis wenig flüssiges Blut; die weichen Häute verwachsen, getrübt. Gyri unregelmässige entwickelt. In der hinteren Schädelgrube nicht ikterisch gefärbtes Serum; Blutgehalt mässig, Erguss in den subarachnoidealen Raum nicht vorhanden. Das Gehirn ist von geringerem Durchmesser als normal, der Conus rechts abgeflacht, ebenso die Medulla oblongata. Die

Seitenventrikel enthalten wenig schwach ikterisch gefärbte Flüssigkeit; ihre Weite normal, das Ependyma nicht verändert. Die Seitenplexus wenig bluthaltig. Die Seitenganglien rechterseits, besonders die Commissura mollis zeigen auf den Durchschnitt weite Blutgefäße, die dünnflüssiges Blut entleeren.

Die graue Substanz ist von blassem Aussehen, ohne dass sich besondere Veränderungen in ihr constatiren liessen. Die Centralganglien zeigen auf dem Durchschnitt starke Feuchtigkeit und Weichheit; der Blutgehalt in ihnen ist mässig.

Der vierte Ventrikel zeigt keine Abnormitäten; die Striae acusticae sind deutlich entwickelt.

Das kleine Gehirn ist weich und feucht ohne besondere Veränderungen. Im Sulcus transversus flüssiges Blut. Die Carotis sinistra zeigt eine kleine aneurysmatische Erweiterung.

In der Bauchhöhle findet sich eine reichliche Quantität intensiv gelb gefärbter klarer Flüssigkeit, ungefähr $1\frac{1}{2}$ Quart betragend. Die Lage der Baueingeweide normal, das Colon transversum durch Gase ausgedehnt. Der Magen liegt im linken Hypochondrium, die Leber ist etwas nach oben gedrängt. Diaphragma links am unteren Rande der 5. Rippe, rechts im vierten Intercostalraum.

Beide Lungen sind durch alte Adhäsionen mit der Thoraxwand verwachsen; das Pericardium liegt frei bis zum Rippenrande, ist stark verdickt, seine Blutgefäße injicirt. Beim Einschneiden des Pericardiums ergiebt sich, dass seine Blätter durch ziemlich leicht lösliche Exsudatmassen unter einander verklebt sind. Das parietale Blatt lässt sich leicht

blösen, die zugewandten Flächen sind mit körnigem Exsudat bedeckt.

An der Herzspitze findet sich ein hühnereigrosser, mit Serum gefüllter Raum; hier sind keine Adhäsionen vorhanden. Beim Abpräpariren der Lungen ergiebt sich der Durchmesser des Herzens beträchtlich vergrössert. Rechter Ventrikel und Vorhof sehr umfangreich, jedoch sehr schlaff. Links im Vorhof und Ventrikel viel Cruor neben etwas dünnflüssigen Blute; rechts im Ventrikel viel dunkles dünnes Blut neben sehr reichlichen Cruorabscheidungen.

Die Muskulatur des linken Ventrikels ziemlich dick ($1\frac{3}{8}$ Zoll), seine Consistenz vermindert, Trabekel abgeflacht, Capillarmuskeln länger als normal; Endocardium milchig getrübt; zwischen den Trabekeln finden sich feste Gerinnsel, wie schon bei Lebzeiten entstanden zu sein scheinen. Die Ventrikularklappen sind normal, das foramen ovale offen. Die Muskulatur zeigt auf dem Durchschnitt weite Blutgefässe, getrübtes Colorit, und viele Fettflecken, so dass neben Atrophie auch fettige Degeneration besteht.

Rechter Ventrikel und Vorhof weiter als normal; Farbe massbraunroth, Trabekel abgeflacht, im Vorhof dieselben Gerinnsel wie links.

Lunge rechts sehr umfangreich, Adhäsionen oedematös; oberer und unterer Lappen fühlen sich derb an; aus dem Bronchus entleert sich schaumige Flüssigkeit. Auf dem Durchschnitt findet sich oben eine hühnereigrosse schiefrige Induration von oedematösen Lungenparenchym umgeben. Weiter nach vorn ebenfalls Oedem; an den vorderen Rändern Emphysem. Der mittlere Lungenlappen ist auf dem

Durchschnitt oedematös; Aus den Bronchien entleert sich ein trübes Sekret.

Bei der genaueren Untersuchung der Lungen markiren sich kleine weisse Flecken als Tuberkeln; an einzelnen Stellen bilden dieselben kleine Nester. Im unteren Lappen zeigen sich ebenfalls kleine Knötchen; doch ist die Entwicklung der Tuberculose an sich noch gering.

Die Lunge links zeigt neben alten Adhäsionen frische Exsudate, zwischen denen sich Miliartuberkel vorfinden, namentlich zwischen dem oberen Lappen und Pericardium. Das Parenchym fühlt sich dicht an; aus den Bronchien entleert sich schaumiges Sekret. Der obere Lappen zeigt starkes Oedem bei mässigem Blutgehalt; auch in ihm markiren sich feine körnige Tuberkel. Der untere Lappen trägt vorn und unten einen haemorrhagischen Infarkt von Hühnereigrösse; das umliegende Parenchym ist verdichtet; der untere Rand zeigt Emphysem, wenig Elasticität und starkes Oedem. Die Lungenarterie ist ikterisch gefärbt, und etwas weiter als normal.

Die Milz ist $5\frac{1}{2}$ Zoll lang, 3 Zoll breit, 1 Zoll dick; das Organ ist breit und glatt, von fester Consistenz. Farbe dunkel, Trabekel entwickelt, Gefässe weit, Malpighi'schen Bläschen wenig ausgesprochen.

Das Omentum ist fettarm, Drüsen in ihm klein, das Duodenum zeigt zahlreiche Narben. Der Magen ist im Pylorustheil ziemlich stark zusammengezogen. Im Duodenum vollkommen gallenloser, schmutzig aschgrau gefärbter Inhalt; die Galle fliesst leicht aus dem ductus choledochus heraus. Im Magen findet sich vollkommen flüssiger, sauer reagiren-

der Inhalt, die Schleimhaut im Pylorustheil verdickt. Das retroperitoneale Bindegewebe ist stark oedematös.

Die Fettkapsel der Niere ist vollkommen geschwunden, die Kapsel lässt sich leicht ablösen; die Oberfläche ist glatt, dunkelbraunroth; nach unten finden sich zwei gelbliche Flecken, die für Tuberkeln angesprochen worden. Auf dem Durchschnitt zeigt die Rindensubstanz ein trübes Aussehen, ist ziemlich bluthältig, und zeigt beginnende Tuberkeln. Die Pyramiden sind sehr verkürzt und abgeflacht, die Schleimhaut im Nierenkelch und Becken ohne Veränderungen.

Die Nebenniere rechts ebenso wie links.

Auch die rechte Niere zeigt im Allgemeinen dieselben Veränderungen wie die linke.

Das Pancreas ist atrophisch.

Die Leber ist kleiner als normal; ihre Oberfläche zeigt runde Tuberkel. Auf den Durchschnitt geringer Fettbeschlag der Klinge; das Organ ist stark hyperaemisch; die Läppchen von sehr geringem Durchmesser. Die peripherischen Theile markiren sich stellenweise kirschroth; an anderen Punkten zeigen die Centren dieses Verhalten. Auch in der Leber finden sich einige Tuberkelknötchen. Das Parenchym ist stark bluthältig; das Blut dickflüssig; in den Gallenkanälchen viel Galle. Die Gallenblase ist mässig gefüllt, ihre Häute sind verdickt, die Galle braunroth, ohne Concretionen.

Die Harnblase ist bereits Behufs Operationsübungen eröffnet.

Im unteren Theile des Ileum gelblich gefärbter Inhalt,

zahlreiche Trichocephalen; besondere Veränderungen sind in ihm nicht zu constatiren *).

Wir sehen in dem mitgetheilten Falle als primäre Krankheit ein von Jugend auf bestehendes Lungenemphysem auftreten. Wiederholte Pneumonien trugen dazu bei, die Funktionsfähigkeit des Organs noch mehr herabzusetzen. In Folge dessen trat einerseits collaterales Oedem der gesunden Lungenpartieen auf, das sich durch die heftige katarthalschen Beschwerden und grosse Dyspnöe charakterisirte, andererseits aber Stauung in den Unterleibsorganen, auf welche die Leber durch Ikterus, die Nieren durch die specifischen oben weitläufig geschilderten Stauungserscheinungen reagierte, die in dem vorliegenden Falle weniger durch Albuminurie, wie durch Oedeme und deren Folgen sich geltend machten. Das Herz, besonders der rechte Ventrikel desselben, wurde in Folge des grossen Widerstandes, welchen die Lungen dem Blutkreislauf setzten, hypertrophisch bis zur Insufficienz seiner Klappen. Als Resultate dieser Circulationsstörung sehen wir die allgemeine Atrophie, die fahle Farbe und ausnehmend geringe Temperatur der äusseren Haut auftreten.

Die beginnende Tuberculose aller Organe, sowie die ganz frische Pericarditis können wohl kaum als zu der geschilderten Symptomengruppe gehörig betrachtet werden, sondern sind wohl vielmehr, ebenso wie der Malariaprozess, als accidentelle Krankheiten zu betrachten, welche auf das

*) Der angegebene Befund schien mir auch in den Punkten, welche direkt mit der Nierenstauung nicht in Zusammenhang stehen, ein so überaus interessanter zu sein, dass ich nicht umbin konnte, ihn hier in toto mit aufzunehmen.

Bild jener nur in sofern von Einfluss waren, als sie die Rapidität des letalen Ausgangs noch beschleunigen halfen.

Fall II.

Am 8. Juni d. J. wurde der Schneidermeister Johann Moldt, 28 Jahre alt, in die hiesige medicinische Klinik aufgenommen.

Die Anamnese ergibt, dass Patient von Kindheit an an starken Herzklopfen gelitten hat; weitere Krankheiten hat derselbe nicht überstanden. Vor etwa 8 Wochen hat Patient, ohne dass er eine Ursache dafür anzugeben wüsste, Oedem beider Unterschenkel und Füße bekommen, welches seit 3 Wochen so bedeutend ist, dass Patient seitdem das Bett hüten muss. Die bei ihm von Jugend auf vorhanden gewesene Cyanose hat sich in der letzten Zeit beträchtlich gesteigert. Ebenso giebt er an, dass sein Schlaf seit jener Zeit unruhiger geworden ist. Der Husten des Patienten ist verschieden heftig, der Auswurf in letzter Zeit copiöser als früher, oft mit blutigen Streifen untermischt. Das Herzklopfen ist augenblicklich sehr stark; Patient hat dabei ein Gefühl von Beengtsein auf der Brust. Der Durst ist sehr stark; die Stuhldejectionen dünn. Patient hat beim Urinlassen keine Beschwerden, doch glaubt er eine Abnahme der Urinmenge beobachtet zu haben.

Die Aufnahme des Status praesens ergibt oedematöse Schwellung des Gesichtes, Cyanose der Ohren, Wangen, Nase, Lippen, des Zahnfleisches, selbst ein bläuliches Aussehen der sonst trockenen Zunge. Die Pulsationen der Carotiden deutlich durch die Haut sichtbar. Herzipuls zwischen der 5. und 6. Rippe, die Regio epigastrica pulsirt. Der

Bauch ist aufgetrieben durch Ascites, starkes Oedem des Scrotum's und der unteren Extremitäten.

Die Temperatur ist nicht erhöht, der Puls normal (64), schnellend.

Die physikalische Untersuchung der Lungen ergibt im Allgemeinen die Symptome eines mässig starken Katarthes. Der Percussionsschall auf der rechten hinteren Stelle des Thorax ist gedämpft bis zur Mitte der Infrascapular-gegend, rechts das Athmen verschwächt, der Pectoralfremitus aufgehoben, dagegen Aegophonie wahrnehmbar; aus allen diesem lässt sich ein pleuritischer Erguss rechterseits diagnosticiren.

Die Auscultation des Herzens lässt anstatt des ersten Herztons ein Geräusch wahrnehmen; der zweite Ton ist normal.

Die Herzdämpfung ist enorm vergrössert; die grösste Dimension derselben ergibt eine Länge von 22 Ctmtr.

Die Sputa sind katarrhalischer Natur, der Urin stark eiweisshaltig.

Es wurden Diuretica und Eisenpraeparate verordnet.

23. 6. Patient fühlte sich wohler; die Cyanose scheint geringer geworden zu sein.

27. 6. Wegen grosser Dyspnoë bekommt Patient 2mal 5 Littre eines Gemisches von Sauerstoff und atmosphärischer Luft zu inhaliren, worauf Erleichterung eintritt.

28. 6. Abermalige Inhalation von 5 Littre Sauerstoff; Patient befand sich danach wohler.

29. 6. Desgleichen Inhalation von 10 Littre Sauerstoff.

30. 6. Patient klagt über grösseren Lufmangel; die Cyanose ist bedeutend; es wurden wieder 10 Littre Sauerstoff inhalirt.

	Temperatur.	Puls.	Respiration.
Vor der Inhalation:	36,4	88	20
Nach der Inhalation:	36,7	92	20

1. 7. Der Eiweissgehalt des Urins nimmt bedeutend zu; es zeigen sich im Sedimente Fibrincylinder.

2. 7. Inhalation von 10 Littres Sauerstoff.

	Temperatur.	Puls.	Respiration.
Vor der Inhalation:	36,0	92	20
Nach der Inhalation:	36,0	92	20

Die vorher bestehende Dyspnoë lässt nach; die Cyanose scheint etwas zu schwinden.

3. 7. Befinden besser.

5. 7. Relativ gutes Befinden; Patient hat keine besonderen Klagen.

8. 7. Grössere Athemnoth, bedeutende Cyanose, Patient giebt an, ein Gefühl von Zusammenschnürung des Halses zu empfinden.

12. 7. Allgemeinbefinden besser; dagegen nimmt das Oedem zu, und fängt an, dem Patienten lästig zu werden.

Ich füge hier noch eine Tabelle von Harnanalysen hinzu, welche ich theilweise selbst unter freundlicher Beihülfe des Herrn stud. med. Schmohl gemacht habe, theils den Angaben des Herrn Dr. Täsler verdanke.

Monat.	Datum	Menge nach Cbktmtr.	Specifisches Gewicht.	Eiweissgehalt in Grammen.	Harnstoffge- halt in Grm.
Juli	4	830	1016	—	—
„	5	1100	1014	—	—
„	6	1270	1013	2,2098	16,0
„	8	900	1015	—	—
„	9	660	1016	1,3926	8,813
„	10	500	1018	—	—
„	11	730	1014	1,1096	11,68
„	12	1130	1012	—	—
„	13	1050	1012	—	—
„	14	1365	1011	—	—
„	15	1200	1010	1,128	10,92
„	17	780	1014	—	—
„	22	720	1019	1,340	—
„	23	650	1020	0,914	—
„	24	825	1018	1,210	—

Der geschilderte Fall bietet wegen des Mangels aller Complicationen ein sehr reines und treues Bild einer Stauungsniere in Folge von Insufficienz der Mitralis und rechtsseitigen pleuritischen Exsudate dar; alles, was wir oben im Allgemeinen über Nierenstauung gesagt haben, passt daher so genau auf unsern Fall, dass wir in Bezug auf die Beurtheilung desselben uns beschränken können, auf Obiges zu verweisen.

Was die Prognose anlangt, so ist dieselbe wohl als eine sehr ungünstige zu betrachten. Abgesehen davon, dass die Grundkrankheit, die bedeutende Insufficienz nicht heilbar ist, droht einerseits die Albuminurie dem Patienten seine

letzten Kräfte zu rauben, während auf der anderen Seite wegen der mangelhaften Circulation in der Lunge, sowie wegen des Oedems in derselben, eine chronische Kohlen- säureintoxikation droht, in nicht allzulanger Zeit den exitus letalis herbeizuführen.

Lebenslauf.

Ich, Hermann Gustav Adolph Leberecht Jonas, bin geboren zu Berlin am 3. Februar 1844. Mein Vater war der im Jahre 1859 zu Berlin verstorbene Prediger an St. Nicolai, Dr. Jonas; meine Mutter Elisabeth, geborne Gräfin von Schwerin, lebt noch in Berlin. Meinen ersten Schulunterricht genoss ich in Berlin auf der Dorotheenstädtischen Realschule, welche damals von meinem Onkel, Director Krech, geleitet wurde. Nachdem ich hier die Vorschule durchgemacht, kam ich Ostern 1854 auf das berlinische Gymnasium zum grauen Kloster unter Bellermanns Directorat, und zwar in die Quinta desselben. Nach 8 Jahren, Ostern 1862, verliess ich die Anstalt mit dem Zeugniss der Reife, um zuerst die Universität Berlin zu besuchen, woselbst ich unter Beseler's Rectorat im Mai 1862 als stud. med. immatriculirt wurde. Herbst desselben Jahres bezog ich die Universität Jena, um von dort im Herbst 1863 wieder nach Berlin zurückzukehren. Nachdem ich daselbst ein Semester studirt, verliess ich für einige Zeit das medicinische Studium, um mich der Landwirthschaft zu widmen, theils meiner damals etwas angegriffenen Gesundheit halber, theils weil ich das letztere Fach für geeigneter für mich hielt; ich erlernte die Landwirthschaft auf einem Gute in der Nähe Berlins, damals Herrn Amtmann Eisleben gehörig, und zwar von Ostern 1864 bis zum Herbste 1865. In dieser Zeit wurde mir jedoch allmählig mein Fehlgriff klar; ich wandte mich daher mit Bewilligung meines Vormundes und Schwagers, des Banquier A. Delbrück in Berlin, wieder dem medicinischen Studium zu, und zwar bezog ich nun die Universität Greifswald, auf der ich am 21. October 1865 immatriculirt wurde, und am 3. März 1866 das Tentamen physicum absolvirte. Am 15. Juli 1867 machte ich das Examen rigorosum.

Während der Zeit meiner academischen Studien habe ich die nachfolgenden Vorlesungen besucht:

In Berlin:

Prof. Braun: Allgemeine Botanik. Ueber das natürliche Pflanzensystem.

Prof. Mitscherlich: Experimentalchemie.

Prof. Lieberkühn: Osteologie und Syndesmologie.

Prof. Reichert: Secierübungen; Theoretische Histologie; Anatomie des Gehirns und Rückenmarks.

Prof. Mitscherlich: Arzneimittellehre.

Prof. Schaum: Medicinische Zoologie.

In Jena:

Prof. Gegenbaur: Descrictive Anatomie.

Prof. v. Bezold: Physiologie.

Prof. Snell: Physik.

Prof. Geuther: Chemisches Laboratorium.

Prof. Fischer: Ueber Lessings Leben und Schriften.

In Greifswald:

Prof. Budge: Präparirübungen; Anatomie der Sinnesorgane.

Prof. Bardeleben: Chirurgische Klinik; Allgemeine und specielle Chirurgie; Akiurgie; Ausgewählte Kapitel der Chirurgie; Operationscursus.

Prof. Mosler: Medicinische Klinik; Physikalische Diagnostik; Ueber Nierenkrankheiten; Specielle Pathologie und Therapie.

Prof. Pernice: Geburtshülfsliche Klinik; Theorie der Geburtshülfe; Frauenkrankheiten.

Prof. Grohe: Allgemeine Pathologie und Therapie; pract. Cursus der pathol. Anatomie.

Prof. Laurer: Verbandlehre.

Dr. Schirmer: Diagnose der Augenkrankheiten; Augenspiegelscursus; Ueber Augenoperationen.

Dr. Heineke: Ueber Frakturen und Luxationen.

Dr. Krabler: Repetitorium der Arzneimittellehre.

Dr. Haeckermann: Gerichtliche Medicin.

Prof. Limpricht: Organische Chemie.

Allen genannten Herren schulde und zolle ich den tiefgefühltesten Dank.



T h e s e n.

I.

*Die sogenannten uraemischen
Intoxikationserscheinungen beruhen nicht auf
Gehirnoedem.*

II.

*In den letzten Stadien von Croup und capillärer
Bronchitis wäre die Injektion von Tartarus stibiatus
in das Blut zu versuchen.*

III.

*Es ist logisch nicht richtig, von Ursprungs- und
Insertionspunkten der Muskeln zu sprechen.*

